

**РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ**  
**открытой олимпиады по математике «Будущее Кузбасса»**

1. Разность квадратов баллов, набранных на олимпиаде девушками и юношами, равна 2017.

Сколько баллов набрали девушки и сколько юноши?

**Решение:**

$x$  – сумма баллов, набранных девушками,  $y$  – юношами.

По условию  $x^2 - y^2 = 2017$ .

2017 – простое число (нужно проверить!), поэтому

$(x - y) \cdot (x + y) = 1 \cdot 2017$ . Отсюда следует, что

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 2017 \end{cases} \quad \text{Решение системы } x=1009, y=1008.$$

**Ответ:** девушки набрали 1009 баллов, юноши – 1008 баллов.

2. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{2}{3}x + \frac{3}{5}y = 5 \\ \frac{1}{3}x - \frac{1}{5}y = \frac{1}{6} \end{cases}$$

**Решение:** Перепишем систему уравнений в виде

$$\begin{cases} 10x + 9y = 75 \\ 30x - 18y = 15 \end{cases}$$

Умножим первое уравнение на 2 и сложим его со вторым уравнением, получим  $50x = 165$ , откуда  $x=3,3$ . Подставляем найденное значение  $x$  в первое уравнение и вычисляем  $y=14/3$ .

**Ответ:**  $x=3,3$ ;  $y=14/3$ .

3. Количество студентов в университете, увеличиваясь на одно и то же число процентов ежегодно, возросло за три года с 5000 до 6655 человек.

На сколько процентов увеличивалось число студентов ежегодно?

**Решение:** Обозначим искомое число процентов за  $x$ .

По условию задачи имеем  $5000 \cdot \left(1 + \frac{x}{100}\right)^3 = 6655$ . Отсюда находим:

$$x = \left(\sqrt[3]{\frac{6655}{5000}} - 1\right) \cdot 100 = 10.$$

**Ответ:** число студентов в университете, увеличиваясь ежегодно на 10%.

4. Из Кемерово в Новокузнецк катер плывет 8 часов, а из Новокузнецка до Кемерово – 6 часов.

Сколько часов будет плыть плот из Новокузнецка до Кемерово?

**Решение.** Обозначим скорость катера  $x$ , скорость течения реки  $y$ , расстояние между Новокузнецком и Кемерово  $a$ . Скорость движения плота равна скорости реки, то есть  $y$ , а его время в пути из Новокузнецка до Кемерово будет равно  $t = a/y$ . По условию задачи имеем следующую систему уравнений

$$\begin{cases} 8 \cdot (x - y) = a \\ 6 \cdot (x + y) = a \end{cases}$$

Разделим оба уравнения на  $y$  и получим систему уравнений:

$$\begin{cases} 8 \cdot (x/y - 1) = t \\ 6 \cdot (x/y + 1) = t \end{cases}$$

Умножаем первое уравнение на 3, второе уравнение на 4. После вычитания из второго уравнения первого уравнения получим  $t = 48$ .

**Ответ:** плот из Новокузнецка до Кемерово будет плыть 48 часов.

5. Упростите выражение

$$\frac{(ab^{-1} + a^{-1}b + 1) \cdot (a^{-1} - b^{-1})^2}{a^2b^{-2} + a^{-2}b^2 - (ab^{-1} + a^{-1}b)}$$

**Решение.** Выпишем числитель:

$$\begin{aligned} (ab^{-1} + a^{-1}b + 1) \cdot (a^{-1} - b^{-1})^2 &= \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1\right) \cdot \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^2 = \left(\frac{a^2 + b^2 + ab}{ab}\right) \cdot \left(\frac{b-a}{ab}\right)^2 = \\ &= \frac{(a^3 - b^3) \cdot (a-b)}{a^3 \cdot b^3}. \end{aligned}$$

Выпишем знаменатель:

$$\begin{aligned} a^2b^{-2} + a^{-2}b^2 - (ab^{-1} + a^{-1}b) &= \frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{a^2} - \frac{a}{b} - \frac{b}{a} = \frac{a^4 + b^4 - a^3b^2 - a^2b^3}{a^2b^2} = \\ &= \frac{a^3 \cdot (a-b) - b^3 \cdot (a-b)}{a^2 \cdot b^2} = \frac{(a^3 - b^3) \cdot (a-b)}{a^2 \cdot b^2}. \end{aligned}$$

После этих преобразований и сокращений равных множителей в числителе и знаменателе окончательно получим  $a^{-1} \cdot b^{-1}$ .

**Ответ:**  $a^{-1} \cdot b^{-1}$ .

6. Решите неравенство

$$x^3 + 8x^2 + 19x + 12 < 0$$

**Решение:** Найдем корни уравнения  $x^3 + 8x^2 + 19x + 12 = 0$ . Корни должны быть отрицательными. Из разложения 12 на множители 1,3,4 можно проверкой установить, что уравнение имеет корни -1, -3, -4.

Определяем знаки левой части неравенства на интервалах  $(-\infty; -4)$ ,  $(-4; -3)$ ,  $(-3; -1)$ ,  $(-1; +\infty)$ . Неравенству удовлетворяют интервалы  $(-\infty; -4)$  и  $(-3; -1)$ .

**Ответ:**  $(-\infty; -4) \cup (-3; -1)$ .

7. Установите, не пользуясь калькулятором, что больше:

$$\sqrt{2016} + \sqrt{2018} \quad \text{или} \quad 2\sqrt{2017}?$$

**Решение:** Возведем каждое выражение в квадрат и получим, что левое выражение равно  $2016 + 2 \cdot \sqrt{2016 \cdot 2018} + 2018$ , а правое выражение равно  $4 \cdot 2017$ .

Вычтем из каждого выражения сумму  $2016 + 2018 = 2 \cdot 2017$ .

После этого запишем левое выражение как

$$2 \cdot \sqrt{(2017-1) \cdot (2017+1)} = 2 \cdot \sqrt{2017^2 - 1}.$$

Сравнивая этот результат с правым выражением  $2 \cdot 2017$ , видим, что правое выражение больше левого.

**Ответ:** большее значение имеет  $2\sqrt{2017}$ .

8. Укажите решения уравнения:

$$\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{4} + x \right) = -2 \quad \text{в интервале } (0; \pi).$$

**Решение:** Воспользуемся формулой для тангенса суммы двух углов и перепишем заданное уравнение в следующем виде:

$$\operatorname{tg} x + \frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x} = -2.$$

Обозначим  $\operatorname{tg} x = t$ , уравнение перепишется как

$$t + \frac{1+t}{1-t} = -2.$$

После умножения левой и правой части уравнения на

$(1-t)$  и приведения подобных членов уравнения, будем иметь  $t^2 = 3$  и  $\operatorname{tg}^2 x = 3$ . Тогда  $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$  или  $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$ . Находим решения этих уравнений в интервале  $(0; \pi)$ .

Этому условию удовлетворяет  $\pi/3$  и  $2\pi/3$ .

**Ответ:**  $\pi/3; 2\pi/3$ .